Forma nona.

1. $\frac{dz^{n}_{-1}\sqrt{e+fz^{n}}}{g+hz^{n}} = y.\sqrt{\frac{d}{g+hz_{n}}} = x.\sqrt{\frac{df}{h}+\frac{eh-fg}{h}xx} = v.\frac{\frac{4fg}{-4ch}s\frac{-2fg}{+2ch}xv+\frac{2dfv}{x}}{nfh} = t.$

2. $\frac{dz^{2n}_{-1}\sqrt{e+fz^{n}}}{g+hz^{n}} = y.\sqrt{\frac{d}{g+hz_{n}}} = x.\sqrt{\frac{df}{h}+\frac{eh-fg}{h}xx} = v.\frac{\frac{4egh}{-4fgg}s\frac{-2egh}{+2fgg}xv+\frac{2}{3}dh\frac{v^{3}}{x^{3}}-2dfg\frac{v}{x}}{nfhh} = t.$

Forma decima.

Fig. 6,7. 1. $\frac{dz^{n-1}}{g+hz_{n}\sqrt{e+fz_{n}}} = y.\sqrt{\frac{d}{g+hz_{n}}} = x.\sqrt{\frac{df}{h}+\frac{eh-fg}{h}xx} = v.\frac{2xv-4s}{nf} = t = \frac{4}{nf}$ ADGa.

2. $\frac{dz^{2n-1}}{g+hz_{n}\sqrt{e+fz_{n}}} = y.\sqrt{\frac{d}{g+hz_{n}}} = x.\sqrt{\frac{df}{h}+\frac{eh-fg}{h}xx} = v.\frac{4gs-2gxv+\frac{2dv}{x}}{nfh} = t.$

Forma undecima.

1. $dz^{-1}\sqrt{\frac{e+fz_{n}}{g+hz_{n}}} = y.\begin{cases}\sqrt{g+hz^{n}} = x.\sqrt{\frac{eh-fg}{h}+\frac{f}{h}xx} = v.\\ \sqrt{h+gz^{-n}} = \xi.\sqrt{\frac{fg-eh}{g}+\frac{e}{g\xi\xi}} = \tau.\end{cases}\frac{dxv^{3}z^{-n}-4dfs-4de\sigma}{nfg-nch} = t.$

2. $dz^{n}_{-1}\sqrt{\frac{e+fz_{n}}{g+gz_{n}}} = y.\ \sqrt{g+hz^{n}} = x.\sqrt{\frac{eh-fg}{h}+\frac{f}{h}xx} = v.\frac{2d}{nh}s = t.$

3. $dz^{2n}_{-1}\sqrt{\frac{e+fz_{n}}{g+hz_{n}}} = y\ \sqrt{g+hz^{n}} = x.\sqrt{\frac{eh-fg}{h}+\frac{f}{h}xx} = v.\frac{dhxv^{3}\frac{-3dfg}{-deh}s}{2nfhh} = t.$

In

In Tabulis hifce utrinq; in infinitum in Tabula prima, mæ tertiæ & quartæ terminorum (2, — tur multiplicando in fe continuo, & ficientes ex initia ipfos gradatim, in $-\frac{5}{4}, -\frac{7}{6}, -\frac{9}{8}, -\frac{11}{10}$, &c. $-\frac{5}{6}, -\frac{7}{8}, -\frac{9}{10}$, &c. 3, 15, 105, &c. E 1, 3, 5, 7, 9, &c.

In fecunda vero primæ, fecundæ, qu folius divifionis, & nis tertiæ & quart finitum.

Quinetiam hæ variari folent. Sic evadit $\frac{d}{z^{\frac{1}{2}n}+1}\sqrt{f+ez}$

PROP.

Sit ADIC Cu AB=z & Ordinata alia cujus Ordinat

SIR ISAAC NEWTON *Opticks* LONDON, 1704 THE WARNOCK LIBRARY